

Familia DELPHINIDAE	Especie <i>Tursiops truncatus</i>	Habitat
---------------------	-----------------------------------	---------

DELFIN MULAR

El delfin mular tiene una gran variabilidad en lo que se refiere a tamaño, forma y color, según la región geográfica en la que vive; de hecho, es probable que incluya varias especies distintas. Es posible distinguir 2 variedades principales: una pequeña, que vive más cerca de la costa y una grande, más robusta, que vive por lo general lejos de ella. Ambas tienen un color bastante complejo aunque, según la incidencia de la luz, la coloración puede parecer un gris uniforme, bastante apagado. Las características principales son su aleta dorsal prominente y oscura y un comportamiento curioso y activo.

Es posible confundirlo con otros delfines grises, como el tucuxi (pág.172), delfin de hocico estrecho (pág.190), calderón gris (pág.206), delfines de dorso giboso (págs. 174-177) y delfines manchados (págs.184-189). Es una especie bastante común y extendida, pero recientemente se han observado descensos de población en el norte de Europa, Mediterráneo y mar Negro.

• **NOMBRE INGLES** Bottlenose dolphin.



COMPORTAMIENTO

Muy activo en la superficie: frecuentes golpes con la cola, saltos en la proa y popa de las embarcaciones, "surf", surca las olas producidas por ballenas grandes y saltos acrobáticos (a veces de varios metros de altura). Puede aparecer en asociación con otros cetáceos, así como tiburones y tortugas de mar. Los ejemplares solitarios y salvajes (por lo general machos) van a veces en busca de bañistas y barcos pequeños, permaneciendo en la misma zona durante años. Nadador muy potente. Las inmersiones no suelen durar más de 3-4 minutos cerca de la costa, pero algo más en alta mar. Cuando sale a la superficie muestra la frente pero pocas veces el pico. En algunas zonas captura peces fuera del agua, llegando hasta la playa antes de volver al mar. Los grupos pueden ayudarse entre sí; en ocasiones coopera con pescadores locales.




VARIACIONES DE COLOR
Los delfines mulares varían mucho en tamaño, forma y color: aquí se presentan tan sólo unas posibles variantes.


Estatus Común	Población Desconocida	Amenazas
---------------	-----------------------	----------

IDENTIFICACION

- color gris apagado
- capa dorsal oscura
- aleta dorsal falcada y prominente
- cuerpo y cabeza robustos
- pico visible con pliegue del melón
- frente redondeada
- por lo general en grupos pequeños
- suele saltar delante de los barcos
- puede ser muy activo



ALETA CAUDAL



AMPLIAMENTE DISTRIBUIDO EN AGUAS TEMPLADAS FRIAS A MARES TROPICALES DE TODO EL PLANETA

DISTRIBUCION
Aparece en muchos mares cerrados, como el mar Negro, Rojo y Mediterráneo, también en el golfo de California (mar de Cortez), México. Algunas poblaciones de alta mar parecen realizar migraciones estacionales mientras que muchas poblaciones costeras son residentes durante todo el año. Fuera de las aguas tropicales es observado preferentemente cerca de las costas, en una gran variedad de hábitats costeros, desde las costas abiertas con abundante oleaje, a las lagunas, estuarios anchos e incluso zonas bajas de ríos y puertos. La forma que vive alejada de las costas es común alrededor de islas oceánicas, pero puede también ser vista en alta mar en el Pacífico tropical oriental y muchas otras zonas. En el Atlántico Norte septentrional no suele superar Gran Bretaña.

Tamaño del grupo 1-10 (costa); 1-25 (mar); en alta mar: 500	Posición de la aleta dorsal Centro	Peso al nacer 15-30kg	Peso del adulto 150-650kg	Dieta
---	------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-------

Familia DELPHINIDAE

Especie *Stenella coeruleoalba*

Habitat  

Estatus Común

Población Desconocida


Amenazas  

DELFIN LISTADO

El delfín listado es bastante fácil de identificar en el mar por sus marcas características; algunos ejemplares tienen también una parte inferior de color rosa brillante. A primera vista puede parecerse al delfín común (pág.164) cuyo tamaño y forma son similares, pero el delfín listado tiene una banda corporal más oscura y, a diferencia del común, no tiene un dibujo amarillo tipo reloj de arena en los flancos. También es posible la confusión con el delfín de Fraser (pág.208) pero el listado es más

aerodinámico, su pico es más largo y la aleta dorsal más falcada. Uno de sus rasgos más distintivos es la marca de color gris en forma de dedo por debajo de la aleta dorsal, pero ésta aparece también en muchos delfines manchados del Atlántico y delfines mulares. Se trata de una especie común, pero su población ha menguado en los últimos años.

• **NOMBRE INGLES** Striped dolphin.



COMPORTAMIENTO

Activo y muy conspicuo. Salta con frecuencia, a veces a alturas de hasta 7m y capaz de realizar acrobacias muy llamativas, como saltos mortales hacia atrás, giros de la cola y chapuzones boca arriba. Cuando nada a gran velocidad, hasta una tercera parte de los miembros del grupo puede estar sobre la superficie en un momento determinado. Las inmersiones duran entre 5 y 10 minutos. Cuando come, se sumerge hasta una profundidad mínima de 200m. En algunas zonas sigue las olas creadas por los barcos (sobre todo en el Atlántico y Mediterráneo) pero en otras es poco habitual que se aproxime a las embarcaciones. En el Atlántico y Mediterráneo los grupos tienden a ser pequeños (menos de 100). Se asocia corrientemente con el delfín común y, en el Pacífico oriental tropical, con los atunes de aleta amarilla. Recientemente, varios varamientos en masa.

IDENTIFICACION



- aleta dorsal oscura y prominente
- banda lateral larga y oscura
- banda oscura del ojo a la pectoral
- dorsal: marca tipo "dedo" pálida
- pico prominente
- cuerpo delgado
- parte inferior blanca o rosa
- gen. en bandos grandes
- activo en la superficie

Tamaño del grupo 10-500 (1-3000)

Posición de la aleta dorsal Centro

algunas aletas dorsales son excepcionalmente altas en relación con el tamaño del cuerpo

aleta caudal pequeña, de color gris claro



AGUAS TEMPLADAS, SUBTROPICALES Y TROPICALES DE TODO EL MUNDO

Peso al nacer Desconocido

Peso del adulto 90-150kg

Dieta   

Recién nacido aprox. 1m
Adulto 1,8-2,5m

Familia DELPHINIDAE

Especie *Delphinus delphis*

Habitat  

Estatus Común

Población Desconocida


Amenazas    

DELFIN COMUN

El delfín común varía tanto en aspecto que a lo largo de los años se han propuesto más de 20 especies. Sólo una especie se reconoce normalmente, aunque con 2 formas diversas –la de pico corto y la de pico largo– que tal vez pronto consigan la categoría independiente de especie. Es posible la confusión con los delfines listados (pág.178), los delfines acróbatas (págs.180-183), los delfines manchados (págs.184-189) y con los delfines de flancos blancos (pág.210), pero el dibujo del

delfín común en forma de cruz o de reloj de arena es un rasgo suficientemente distintivo. Existen diferencias sutiles en la coloración de ambos sexos. Aunque hay una cierta evidencia de descenso de la población en el mar Negro, Mediterráneo y Pacífico tropical oriental, sigue siendo aún uno de los cetáceos más abundantes del planeta, seguramente con una población total de varios millones.

• **NOMBRE INGLES** Common dolphin.



COMPORTAMIENTO


Suele aparecer en grupos grandes y activos: incluso desde lejos se ven y oyen los saltos y las salpicaduras. Varios miembros de un grupo suelen salir juntos a la superficie. El tamaño del grupo varía normalmente con la época del año y también el momento del día. Los animales se agrupan mucho cuando están asustados. Es un nadador rápido y un acróbata. Suele dar chapuzones, golpea el mentón contra el agua, también las aletas pectorales, da coletazos, sigue estelas y realiza saltos (a veces saltos mortales). Vocaliza mucho: sus chillidos agudos pueden ser oídos por encima de la superficie del agua. Las inmersiones pueden durar hasta 8 minutos, aunque suelen durar 10 seg y 2 min. Puede asociarse con otros delfines en buenas zonas de alimentación y, en el Pacífico tropical oriental, con el atún de aleta amarilla.

IDENTIFICACION


- capa oscura con una "V" por debajo de la aleta dorsal
- dibujo tipo cruz en los flancos
- vientre y flancos blancos
- aletas básicamente oscuras
- mancha amarillenta en los flancos
- línea oscura de pectorales al pico
- aleta dorsal y pico prominentes
- muy activo

Tamaño del grupo 10-500 (1-2000), más en el Pacífico tropical oriental

Posición de la aleta dorsal Centro



Recién nacido 80-90cm
Adulto 1,7-2,4m



AGUAS TEMPLADAS CALIDAS, SUBTROPICALES Y TROPICALES DE TODO EL MUNDO

DISTRIBUCION

Ampliamente distribuido, aunque parece haber muchas poblaciones distintas. Aparece en muchas aguas cerradas como el mar Rojo y el Mediterráneo. Puede ser menos corriente en el océano Índico. Presente durante todo el año en las mismas zonas, pero muchas poblaciones parecen moverse estacionalmente y muestran máximos locales de abundancia en diferentes épocas del año. Por lo general aparece donde la temperatura del agua superficial es de 10-28°C, lo que limita la distribución por el norte y sur, pero puede seguir las corrientes de aguas cálidas y salirse de su ámbito habitual. Menos frecuente en aguas superficiales (menos de 180m de profundidad). También sobre la plataforma continental, sobre todo en zonas con gran relieve del fondo, pero sobre todo lejos de las costas.

Peso al nacer Desconocido

Peso del adulto 70-110kg

Dieta  

Familia DELPHINIDAE

Especie *Delphinus delphis*

Habitat  

Estatus Común

Población Desconocida

Amenazas   

FORMAS GEOGRAFICAS

Desde un punto de vista taxonómico, el delfín común es un animal muy complejo, ya que hay muchas variaciones. Las investigaciones realizadas en California y México han revelado 2 formas distintas: la de pico largo y la de pico corto. Estas pueden mostrar sutiles diferencias físicas y de comportamiento y las evidencias recientes, basadas en estudios morfológicos y genéticos, sugieren que pueda tratarse de dos especies distintas. En base a las limitadas observaciones puede decirse que ambas formas parecen ser también distinguibles en otras partes del mundo. Tanto las formas de pico largo como de pico corto presentan toda una serie de variaciones más

sutiles dentro de sus propias poblaciones. Seguramente se trata de subespecies diferentes aunque no tanto como para conceder a los animales el rango de especie. Las subespecies varían mucho en tamaño corporal —desde una media de 1.8m en el mar Negro a 2,4m en el océano Indico— y en color, aunque todas tienen un dibujo tipo reloj de arena en los flancos. Una variante bien estudiada de la forma de pico largo es la llamada subespecie Baja nerítica hallada en el golfo de California (mar de Cortez), México, y en el Pacífico tropical oriental al norte de los 20°N; esta forma aparece sobre todo en aguas superficiales, con una profundidad comprendida entre los 20 y los 180m.

ACROBATA AGIL

Los delfines comunes son muy vivaces y acrobáticos y pueden pasar tanto rato fuera del agua —zambulléndose o saltando— como lo pasan ocultos bajo la superficie. Este delfín fue fotografiado en la bahía de Monterey, California, E.E.U.U.



aleta dorsal triangular, casi toda blanca o gris • claro con un borde oscuro

cola de color gris claro

FORMA BAJA NERITICA

el alcance y el tono de gris en el pedúnculo caudal pueden variar

color del pico variable

color más apagado que las formas de pico corto

la intensidad de la zona amarilla puede variar

el tono de las aletas pectorales puede variar

línea de la aleta pectoral al pico variable

tono de la aleta dorsal variable

los detalles del dibujo facial pueden variar

VARIACION DE COLOR

Todos los delfines comunes pueden ser identificados por el elaborado dibujo tipo reloj de arena en sus flancos (blanco, gris, amarillo y negro); con poca luz, la forma en V formada por la capa dorsal situada justo por debajo de la aleta dorsal es el rasgo más distintivo. No obstante, hay muchas variaciones de color dentro de este esquema básico. La aleta dorsal, por ejemplo, varía de negro o negro con una mancha gris en el centro, a casi blanco con un borde oscuro. Otras variaciones incluyen el número y forma de las líneas amarillas y grises de los flancos, la cantidad de gris pálido en el pedúnculo caudal, la intensidad de la mancha amarilla y detalles de la coloración facial. Los ballenatos tienen coloraciones similares a los adultos pero mucho más pálidas.

dibujo tipo reloj de arena (reconocible en todas las variedades del delfín común)

pico largo

pico corto, ligeramente grueso

FORMA DE PICO CORTO

pico largo y fino

FORMA DE PICO LARGO

PICO

La diferencia más obvia entre el delfín común de pico corto y largo es la longitud y anchura del pico. No obstante, hay también otros rasgos distintivos. La forma de pico corto tiene un cuerpo algo más rechoncho, la cabeza más redondeada, un dibujo más complejo en su pico, una mancha negra más visible alrededor del ojo, una banda más estrecha entre la mandíbula inferior y la aleta pectoral y un color más brillante; suele vivir lejos de la costa. La forma de pico largo tiene un perfil más fino, tiene poco o nada de blanco entre el ojo y la aleta pectoral, su frente es más suave, el dibujo del pico más simple y un color más apagado; suele vivir cerca de la costa. También pueden haber diferencias de comportamiento entre ambas formas.

VARIACIONES DE LA FORMA DE PICO CORTO

Tamaño del grupo 10-500 (1-2000), más en el Pacífico tropical oriental

Posición de la aleta dorsal Centro

Peso al nacer Desconocido

Peso del adulto 70-110kg

Dieta 